

## PAKNINGSVEDLEGG

**Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.**

*Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning:*

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
- Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.

*Scheriproct rektalsalve:*

Scheriproct rektalsalve er reseptfri. Likevel må Scheriproct rektalsalve brukes som anbefalt for å oppnå best mulig resultat.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
- Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
- Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres innen 7 dager.

**I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:**

1. Hva Scheriproct er, og hva det brukes mot
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Scheriproct
3. Hvordan du bruker Scheriproct
4. Mulige bivirkninger
5. Oppbevaring av Scheriproct
6. Ytterligere informasjon

### **Scheriproct stikkpiller**

prednisolon, cinkokain

- Virkestoffer er prednisolonkaproat tilsvarende prednisolon 1 mg og cinkokainhydroklorid 1 mg
- Hjelpestoff er hardfett 1,8 g

### **Scheriproct rektalsalve**

prednisolon, cinkokain

- Virkestoffer er prednisolonkaproat tilsvarende prednisolon 1,5 mg/g og cinkokainhydroklorid 5 mg/g.
- Hjelpestoffer er 2-oktyldodekanol, lakserolje, makrogol 400–monoricinoleat, parfymeolje (Chypre).

### **Innehaver av markedsføringstillatelsen**

Intendis GmbH Berlin  
Max-Dohrn-Strasse 10  
D-10589 Berlin,  
Tyskland

### **Tilvirker:**

Intendis Manufacturing SpA, Italia

## **1. HVA SCHERIPROCT ER, OG HVA DET BRUKES MOT**

Scheriproct er et legemiddel som kan brukes ved hemorroider i og omkring endetarmsåpningen. Legen kan også bruke preparatet ved smertefulle hudsprekker rundt endetarmsåpningen eller ved betennelse i slimhinnen i

endetarmen.

Scheriproct virker desinfiserende, smertestillende, kløestillende og helende på slimhinnen i endetarmen. Prednisolon har en kraftig betennelsesdempende virkning, cinkokainhydroklorid har en rask smertestillende effekt.

Scheriproct finnes som rektalsalve og stikkpiller. Rektalsalven finnes i tuber à 10 og 30 gram. Rektalsalven er reseptfri til og med 1 tube à 30 g. Stikkpillene finnes i pakning à 12 stk. og i en kombinasjonspakning med 10 stikkpiller og 10 gram salve.

## 2. HVA DU MÅ TA HENSYN TIL FØR DU BRUKER SCHERIPROCT

### Bruk ikke Scheriproct:

- hvis du har tuberkulose eller syfilis i endetarmen
- ved virusykdommer f.eks. vannkopper, herpes simplex
- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor prednisolon eller cinkokainhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Scheriproct

### Vis forsiktighet ved bruk af Scheriproct:

- bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket. Hvis irritasjon eller blødning fra endetarm oppstår, bør lege kontaktes.
- Unngå å få preparatet i øynene. Hendene vaskes grundig etter bruk.
- Tilleggsbehandling anbefales ved soppinfeksjon.

### Graviditet

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten. Det er sannsynlig at fosteret kan påvirkes. Rådfør deg derfor med lege før bruk av Scheriproct dersom du er gravid.

### Amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.

Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Scheriproct ved amming.

### Bilkjøring eller bruk av maskiner:

Scheriproct stikkpiller og rektalsalve antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

### Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Scheriproct:

Scheriproct rektalsalve inneholder lakserolje, som kan forårsake alvorlige allergiske reaksjoner.

### Bruk av andre legemidler sammen med Scheriproct:

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler og naturmidler.

## 3. HVORDAN DU BRUKER SCHERIPROCT

### Dosering:

**REKTALSALVE:** Skal helst påføres etter avføring. Området rundt endetarmsåpningen gjøres forsiktig rent, og en ertestor mengde rektalsalve smøres i og omkring endetarmsåpningen. Framfallende knuter påføres et tykt lag rektalsalve og trykkes forsiktig inn med fingeren. For å bruke rektalsalven inne i endetarmen skrur man det vedlagte røret på tuben. Ved betente eller særlig smertefulle tilstander kan det være bedre å påføre rektalsalven med fingeren, også på innsiden av tarmen. Vanligvis påføres rektalsalven 2 ganger daglig, men opptil 4 ganger på den første dagen for å oppnå en raskt innsettende lindring. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette i minst en uke etter at symptomene forsvinner, men det kan da benyttes lengre doseringsintervall (f.eks. en gang daglig).

Må ikke brukes mer enn 1 uke av gangen uten etter avtale med lege. Hvis tilstanden ikke bedres inden 1 ukes behandling må lege kontaktes.

**STIKKPILLER OG KOMBINASJONSPAKNING:** Bruk alltid Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Dosen bestemmes av legen som tilpasser den for deg. Skal helst innføres etter avføring. Vanligvis innføres en stikkpille dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter kan det innføres 2–3 stikkpiller den første dagen.

For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette i minst en uke etter at symptomene forsvinner, men det kan da benyttes lengre doseringsintervall (f.eks. en stikkpille annen–hver dag). Imidlertid bør behandlingperioden ikke overstige 4 uker.

Hvis du mener at virkningen av Scheriproct er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.

#### **Dersom du tar for mye av Scheriproct:**

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek

#### **4. MULIGE BIVIRKNINGER**

Som alle legemidler kan Scheriproct ha bivirkninger.

I sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme. Ved langtidsbruk (mer enn 4 uker) kan huden bli tynnere.

Informér lege eller apotek dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

#### **5. OPPBEVARING AV SCHERIPROCT**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Rektalsalve: Oppbevares ved høyst 25 °C.

Stikkpiller: Oppbevares i kjøleskap (2–8 °C). Stikkpillene kan oppbevares i høyst to måneder ved 25 °C.

Bruk ikke Scheriproct stikkpiller og rektalsalve etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.

#### **6. YTTERLIGERE INFORMASJON**

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til det lokale informasjonskontor for innehaveren av markedsføringstillatelsen

##### **Norge**

Bayer AS

Postboks 14

0212 Oslo

Tel (+47) 24 11 18 00

**Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 2012-06-22**

Ordforklaringer til teksten

##### **LÆR MER:**

[Sykdommer](#)

[Nyttig om medisiner](#)